



GRANDES CULTURES

Bulletin n° 54 (18/90) du 27 FEVRIER 1991

**CLOQUE
TRAITEMENT D'HIVER**: Première intervention
: Il est encore temps

PECHER

CLOQUE

Situation

Le relèvement des températures prévu pour toute la semaine va accélérer la végétation. En toutes zones, le stade B de début de sensibilité est ou va être atteint.

Préconisation

Intervenir dès réception avec (en g/hl) : **captane** (250), **ferbame** (175), **thirame** (200), **zirame** (180).

Mouiller abondamment pour un bon enrobage des bourgeons.

La lutte contre la cloque est uniquement préventive, il convient donc de bien positionner le **premier traitement**.

Le renouvellement sera fonction des pluies. Le stade sensible se prolonge jusqu'à l'étalement des premières feuilles.

POIRIER

PSYLLE

Les femelles ont repris leur activité de ponte depuis le 20 Février. Les variétés les plus précoces sont au stade B. Il est encore temps de réaliser une intervention avec des colorants nitrés à la dose de 600 g/hl. Mouiller abondamment.

POMMIER

Certaines variétés arrivent au stade B (Clochard, Reine des Reinettes).

TRAITEMENT D'HIVER

Ils permettent de limiter les formes de conservation d'insectes et acariens.

Ces traitements sont à réaliser dès que possible dans les parcelles où acariens rouges, pucerons ont posé des problèmes en 1990. Ces interventions sont peu nocives sur la faune auxiliaire peu présente dans les vergers en cette saison.

Mouiller abondamment ; ces produits doivent enrober les formes de conservation pour avoir une efficacité satisfaisante (asphyxie).

Traiter par temps calme sur bois sec, **avant débourrement**, avec :


- huiles de pétrole, huile blanche d'hiver à 2 l/hl (Oliocin, Pest-oil, Ovipron, Euphytane...) ;
- huiles jaunes : huiles blanches + D.N.O.C.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE RÉGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : R. GUILLEMET
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 195 F
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

**Cartes des zones de précocité à utiliser principalement pour le carpocapse
(A CONSERVER)**



Données biologiques

TAVELURE

Les asques sont murs. Dès que les stades sensibles pommier poirier seront atteints, les contaminations seront possibles.

ACARIENS

Peu d'oeufs clairs (< 5 %)

Prévision des éclosions

Zone 1

Jonzac Saintes : vers le 15/03/1991
 Barbezieux Ruffec : vers le 20/03/1991.

Zone 2

Poitiers : vers le 25/03/1991.

Zone 3

Vernoux en Gâtine : vers le 5/04/1991.

Ces dates seront précisées ultérieurement.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
 Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.